




MONITOREO SATELITAL DEL ESTADO DE LA VEGETACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Octubre de 2017

El informe se realiza a partir del monitoreo y análisis de la variación relativa del índice de vegetación EVI extraído de imágenes satelitales MODIS. El EVI es un estimador de la productividad del pastizal. Se presenta la variación de la 2ª quincena de agosto y las 1ª y 2ª quincenas de septiembre de 2017, respecto a la serie histórica 2000-2016. Las imágenes presentan gran cobertura de nubes, nieve y errores en la zona cordillerana.



Área con mejoría en la producción del pastizal. El norte, centro y sureste de la provincia presenta valores de producción forrajera mayores a la media (tonos verdes). Se advierte una reducción de las zonas de mayor productividad en los departamentos del oeste provincial. En muchos casos las precipitaciones acumuladas en el año y las temperaturas de agosto y septiembre fueron favorables para el pastizal, lo cual permitiría afrontar la crianza de los corderos y mejorar el estado de las madres en esta temporada.



Área con valores normales. En amplios sectores del noreste, sureste y oeste de la provincia se incrementó el área con valores cercanos al promedio histórico de producción del pastizal (tonos amarillos). Es importante en esta época que los pastizales rebroten normalmente. Deberá seguir controlándose el estado de la hacienda para asegurar una correcta señalada.


Sectores con errores en las imágenes, nubes o cobertura de suelo que impide evaluar la vegetación.

Área con baja producción del pastizal. Se registran pocas zonas dispersas que presentan déficits de producción del pastizal (tonos rojos y naranjas) en el Departamento Gaiman y algunos sectores al sur del Departamento Mártires. Se advierte una mejora en la producción del pastizal en la Península Valdés (zona centro sur) ya que disminuyen los tonos rojos. Deberá controlarse el estado de la hacienda, para evitar complicaciones en esta temporada, especialmente de las ovejas delgadas y/o con cría al pie.

OCTUBRE 2017

RECOMENDACIONES PARA LA GANADERÍA OVINA EXTENSIVA EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT

SR. PRODUCTOR:



El monitoreo realizado con imágenes satelitales muestra que durante las últimas semanas **se ha incrementado el área con valores normales de producción del pastizal, y ha disminuido levemente el área con producciones mayores al promedio, debido a menores precipitaciones** y que aún tenemos **bajas temperaturas** que demoran el rebrote de las especies herbáceas. En cuanto a los animales, se debe tener en cuenta que es una **época altos requerimientos de las ovejas**, por lo que **toda intervención tendrá incidencia sobre los resultados de las señaladas y**

destetes (número y estado de los corderos logrados) y sobre la condición corporal de las madres.

En esta época del año, con las diferencias propias que hay entre regiones, comienzan las **esquilas postparto**, continúan las **pariciones** o se están realizando las **señaladas** de los corderos en sistemas de esquila tradicional. Para lograr un buen manejo de la majada y del pastizal en las circunstancias actuales, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones:

1-Durante las pariciones **intensifique las recorridas de los cuadros de ovejas madres** y el control de predadores. **En lotes pequeños y/o de alto valor genético** de hasta 400 animales, **las pariciones controladas en cobertizo** pueden producir un alto impacto en la cantidad de corderos logrados (85 a 90 % señalada).

2- Durante la esquila **efectúe los arreos de las ovejas y los corderos en forma tranquila**. Evite que los animales permanezcan encerrados por más de 12 horas sin agua ni comida. Posteriormente, al volver los animales al cuadro, **realice repuntes para evitar el aguachamiento**.

3- En la señalada, **identifique las ovejas vacías** o que han perdido la cría, y en caso de ser posible destínelas a cuadro de capones y alivie los de madres con cría al pie. Evalúe la venta de refugos.

4- La esquila es una buena oportunidad para **realizar control de melófagos (falsa garrapata)** ya sea mediante tratamientos inyectables, pour-on o aspersiones. Recuerde tratar la totalidad de animales del cuadro afectado.

5- Previo a la parición (en la esquila preparto o pelada de ojos), **determine la condición corporal de las ovejas preñadas** para decidir un posible manejo diferencial de los animales flacos. Si su campo se encuentra en las zonas de menor producción forrajera **planifique con tiempo la posible suplementación de las ovejas preñadas o con cría.**

Recuerde que la parición es un momento fundamental dentro del ciclo productivo. Todos esfuerzo se verá reflejado en una mayor cantidad de corderos señalados.